

**Wells-Kriterien** zur Bestimmung der Pretest-Wahrscheinlichkeit einer TVT:

*Table 1: Bestimmung der klinischen Wahrscheinlichkeit einer Venenthrombose (TVT)*

<b>Klinische Charakteristik</b>	<b>Score</b>
Aktive Krebserkrankung	1,0
Lähmung oder kürzliche Immobilisation der Beine	1,0
Bettruhe (>3 Tage); große Chirurgie (<12 Wochen)	1,0
Schmerz /Verhärtung entlang der tiefen Venen	1,0
Schwellung ganzes Bein	1,0
Schwellung Unterschenkel >3 cm gegenüber Gegenseite	1,0
Eindrückbares Ödem am symptomatischen Bein	1,0
Kollateralvenen	1,0
Frühere, dokumentierte TVT	1,0
Alternative Diagnose mindestens ebenso wahrscheinlich wie tiefe Venenthrombose	-2,0
<b>Wahrscheinlichkeit für TVT</b>	<b>Score</b>
hoch	≥ 2,0
nicht hoch	< 2,0

Nach: Wells et al. 2003 [128]

negative D-Dimere und mittlere/hohe Pretest-Wahrscheinlichkeit --weitere Ausschlussdiagnostik

Pathophysiologisches Sine qua non :Virchow Trias :  
 patholog. Fluss+ patholog. Blutzusammensetzung+patholog. Gefässwand ---  
 Thrombose