

PATIENTENINFORMATION

Blutgerinnungshemmende Therapie

Was sollte ich über die blutgerinnungshemmende Therapie wissen?

- Das Medikament verändert die körpereigene Blutgerinnung dahingehend, dass die Gefahr einer Bildung von Blutgerinnseln, die potenziell die eigene Gesundheit gefährden, vermindert wird.
- Die Einnahme muss nach Anleitung Ihres Arztes/Ihrer Ärztin erfolgen, um einen optimalen Schutz vor Blutgerinnseln zu gewährleisten. Lassen Sie niemals eine Dosis aus.
- Setzen Sie das Medikament nicht ohne Rücksprache mit Ihrem Arzt/Ihrer Ärztin ab. Ihr Risiko, ein Blutgerinnsel zu bilden, ist erhöht.

Wann sollte ich den Arzt/die Ärztin oder den Apotheker/die Apothekerin um Rat fragen?

Bei der Einnahme eines blutgerinnungshemmenden Medikamentes ist es wichtig, mit den möglichen Nebenwirkungen vertraut zu sein. Beginnen Sie mit der Einnahme des Medikamentes keinesfalls, wenn Sie wissen, dass bei Ihnen ein Blutungsrisiko besteht. Sprechen Sie zuerst mit Ihrem Arzt/Ihrer Ärztin darüber. Informieren Sie sofort Ihren Arzt/Ihre Ärztin oder Ihren Apotheker/Ihre Apothekerin, wenn bei Ihnen folgende Anzeichen oder Symptome für eine Blutung bestehen:

- Schmerzen
- Schwellung an Körperstellen
- Unwohlsein
- Kopfschmerzen, Schwindel oder Schwäche
- Ungewöhnliche blaue Flecken, Nasenbluten, Zahnfleischbluten, langanhaltende oder sehr starke Blutungen aus Schnittwunden
- Eine Monatsblutung oder vaginale Blutung, die stärker ist als üblich
- Blut in Ihrem Urin, der dadurch rötlich oder braun aussehen kann
- Blutungen im Magen-/Darmtrakt, welche sich durch rot oder schwarz gefärbten Stuhlgang zeigen
- Abhusten von Blut
- Kaffeesatzartiges und/oder blutiges Erbrechen

Wie nehme ich ein blutgerinnungshemmendes Medikament ein?

- Nehmen Sie das Medikament nach ärztlicher Verordnung regelmässig ein.
- Nehmen Sie das Medikament immer zur selben Zeit ein.
- Ändern Sie die Dosierung nicht.
- Dosis nachholen: Die vergessene Dosis kann am selben Tag eingenommen werden.
- Doppeldosis vermeiden: Nehmen Sie am nächsten Tag nicht zwei Dosen auf einmal und überschreiten Sie die Tagesdosis nicht.

Wen muss ich über meine blutgerinnungshemmenden Medikamenteneinnahme informieren?

Sie bekommen von der Pflegefachperson einen persönlichen Gerinnungsausweis in Kreditkartenformat. Tragen Sie diesen Ausweis ständig bei sich (z.B. in der Geldtasche).

- Informieren Sie Ihren Arzt/Ihre Ärztin oder Ihren Zahnarzt/Ihre Zahnärztin vor jeglicher Operation oder invasivem Verfahren darüber, dass Sie ein blutgerinnungshemmendes Medikament einnehmen.
- Zeigen Sie diesen Ausweis jedem Arzt/jeder Ärztin oder Zahnarzt/Zahnärztin vor der Behandlung und wenn Ihnen ein neues Medikament verschrieben wird.

Weitere Informationen finden Sie hier:



Quelle: <https://www.swissmedicinfo.ch/ShowText.aspx?textType=PI&lang=DE&authNr=58728>

Quelle: <https://www.edumaterial.bayer.de/de-xarelto>

Kantonsspital Graubünden
Kardiologie
Loëstrasse 170, 7000 Chur
+41 81 256 68 63 | ksgr.ch

   KantonsspitalGR